

СТАН ЗДОРОВ'Я ЖІНОК ПІСЛЯ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ В ПІЗНІХ ТЕРМІНАХ

*Денисенко О.В., магістр
Науковий керівник – доц. Сумцов Г.О.
СумДУ, медичний інститут,*

кафедра сімейної медицини з курсом ендокринології

Переривання вагітності у пізніх термінах залишається значною соціальною проблемою у зв'язку з тим, що у значному числі випадків виникають ускладнення, які порушують репродуктивне здоров'я жінок та можуть загрожувати життю.

Нами проаналізовані наслідки переривання вагітності у пізніх термінах у 221 жінки у післяабортному періоді. У 59 (26,69%) із них під час переривання вагітності виникли такі ускладнення:

- Затримка частин плоду з повторною інструментальною ревізією матки – 25 (11,3%)
- Затримка родорозрішення більше 2 діб – 10(4,5%)
- Ендометриїт – 3 (1,4%)
- Гематометра – 14 (6,3%)
- Гіпотонічна кровотеча – 1(0,5%)
- Гострий тромбофлебіт вен гомілки – 1(0,5%)
- Перитоніт – 1(0,5%)
- Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти – 4(1,8%).

Слід відмітити, що перитоніт та 2 випадки гіпотонічної кровотечі завершилися терміновою лапаротомією.

За 75-ми жінками із 221 прослідковано віддалені наслідки на протязі від 3 до 5 років. У них виникли наступні ускладнення:

- 28 жінок мають запальні захворювання жіночих статевих органів.
- 16 жінок мають дисфункцію яєчників.
- 4 жінки - безпліддя.
- 15 жінок – ерозію шийки матки та ендометрію.
- 4 жінки – мастопатію.
- 2 жінки померли від раку молочної залози та раку шийки матки.
- 38 жінок завагітніли. Із них 4 жінкам виконано артефіціальні аборти. У 1–пузирний занос. У 8 жінок вагітність ускладнилася фето-плацентарною недостатністю, загрозою переривання вагітності, прееклампсією, невиношуванням вагітності. У 5 жінок мало місце порушення пологової діяльності. 2 жінкам виконано кесарів розтин через низьку плацентацию.
- Решта (18жінок) запобігали вагітності.

Із проведеного аналізу видно, що показники репродуктивного здоров'я після переривання вагітності у пізніх термінах значно нижчі, ніж у загальній популяції. Переривання вагітності у пізніх термінах є значним ризиком для репродуктивного здоров'я жінок. Для їх профілактики необхідна значна предконцепційна робота серед жінок з метою недопущення непоказаної вагітності.